

ЗАЩИЩАЯ СЕБЯ, МЫ ЗАЩИЩАЕМ ДРУГИХ!

Результаты медицинских исследований показывают, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, а значит повышается вероятность заболевания при встрече с коронавирусной инфекцией. После появления заразных штаммов дельта и омикрон стало понятно, что без ревакцинации не обойтись. Чем больше людей пройдут полный курс вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции, тем полноценнее окажется коллективный иммунитет.



Чем обусловлена необходимость ревакцинации против COVID-19?

Ревакцинация - повторная прививка. Она проводится с такой же целью, как и в первом случае - помочь иммунитету бороться с вирусом и не допустить тяжелого течения болезни. Ревакцинацию против COVID-19 называют бустерной (от английского booster - повышать, усиливать)

Зачем нужна ревакцинация от коронавируса?

К сожалению, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается. Чтобы составляющие иммунитета, такие как антитела, В-лимфоциты, Т-клетки памяти, вновь работали, прививку необходимо повторить.

Когда делать повторную прививку?

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации ревакцинироваться необходимо через 6 и более месяцев после завершения курса основной (первичной) вакцинации с использованием вакцины "Спутник Лайт", которая вводится однократно, что позволяет поддерживать устойчивый иммунный ответ.



Записаться на процедуру ревакцинации можно по телефону 24-1-54, либо на сайте Островецкой ЦРКБ

Отдел общественного здоровья ГОЦГЭОЗ